Элитные агросистемы

Внимание! Приобретайте препараты ООО "Элитные Агросистемы" только у официальных дистрибьюторов.

+7 (499) 322-01-24
info@microvit.ru
www.microvit.ru
Московская обл., г. Воскресенск,
ул. 2-я Заводская, зд. 18, оф. 23

Элитные агросистемы

Элитные агросистемы

МИКРОВИТ-3

ХЕЛАТ Zn

Жидкое моно-микроудобрение с высоким содержанием хелата цинка

Профессиональная серия

МИКРОВИТ-3

хелат Zn

Жидкое моно- микроудобрение с высоким содержанием хелата цинка. Основное применение - внекорневая подкормка с/х культур. Также может применяться при обработке семян, корневой подкормке, гидропонных системах.

Состав, г/л:

N	S	Zn	Cu
17	**40**	**80**	**0,25**

Плотность: 1,2 - 1,3 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 3,0 - 3,5

Цинк в растениях:

- активирует более, чем 20 ферментов, участвующих в дыхании, синтезе белков и ауксинов;
- влияет на процессы оплодотворения и развития зародыша;
- играет важную роль в регулировании процессов роста;
- улучшает синтез сахаров и крахмала, общее содержание углеводов, белков, аскорбиновой кислоты и хлорофилла;
- повышает жаро- и морозостойкость;
- повышает стойкость к грибковым и бактериальным заболеваниям.

Заболевания, вызываемые дефицитом цинка:

- "белые ростки" или "белая почка" кукурузы;
- розеточная мелколистность, горькая ямчатость, суховершинность, снижение морозостойкости плодовых;
- "мраморный" хлороз капусты;
- вершинная гниль стеблей огурца;
- крапчатость листьев бобовых.

Чувствительны к недостатку цинка:

- кукуруза,
- соя,
- рис,
- горох,
- фасоль,
- лён,
- хлопчатник,
- томат,
- сорго,
- плодовые и цитрусовые,
- виноград.

Особенно большое значение имеет цинк для развития риса и кукурузы.

Способы и нормы применения

Препарат применяется в чувствительные к элементу фазы развития растения (начальные периоды роста, фаза активного формирования вегетативных органов).

Культура	Норма расхода, л/га	Фаза
Зерновые	0,3 - 1,0	Фаза кущения, выхода в трубку
Кукуруза	0,5 - 1,5	Фаза 3-5 листьев, фаза 6-9 листьев
Картофель	0,3 - 1,0	При высоте растений 10-15 см, фаза бутонизации
Сахарная свекла	0,3 - 1,5	Фаза 3-5 листьев, далее 1-2 обработки с интервалом 2 недели
Овощные и ягодные культуры	0,3 - 1,5	2-3 обработки за вегетацию с интервалом 2 недели
Плодовые культуры, виноград	1,0 - 3,0	3-4 обработки за вегетацию с интервалом 2 недели
Цветочно-декоративные	0,1 - 0,4	По необходимости, не чаще 1 раза в 2 недели
Газонные травы	0,5 - 1,0	Некорневые подкормки 2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней
Гидропоника, малообъёмные технологии	Корректировка концентрации элемента питания в маточном растворе	- Компонент для маточного раствора, - внесение через системы полива.