Элитные агросистемы

Внимание! Приобретайте препараты ООО "Элитные Агросистемы" только у официальных дистрибьюторов.

+7 (499) 322-01-24
info@microvit.ru
www.microvit.ru
Московская обл., г. Воскресенск,
ул. 2-я Заводская, зд. 18, оф. 23

Элитные агросистемы

Элитные агросистемы

МИКРОВИТ-4

ХЕЛАТ Cu

Жидкое моно-микроудобрение с высоким содержанием хелата меди

Профессиональная серия

МИКРОВИТ-4
хелат Cu

Жидкое моно- микроудобрение с высоким содержанием хелата меди. Основное применение - внекорневая подкормка с/х культур. Также применяется при обработке семян, корневой подкормке, в гидропонных системах.

Состав, г/л:

N	S	Cu
6	**30**	**60**

Плотность: 1,1 - 1,2 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 5,5 - 6,5

Значение меди для растений:

- улучшает интенсивность фотосинтеза, способствует образованию хлорофилла;
- положительно влияет на углеводный и азотный обмены;
- усиливает засухо-, морозо- и жаростойкость;
- повышает устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням;
- повышает устойчивость к полеганию;
- увеличивает содержание белка в зерне, сахара - в корнеплодах, жира - в зерне масличных культур, крахмала - в картофеле, сахара и аскорбиновой кислоты - в плодах и ягодах;
- является единственным элементом, улучшающим рост в условиях аммиачного питания.

Проявление недостатка железа:

- пожелтение тканей между жилок, спустя время она буреет и некротизируется;
- торможение роста, задержка цветения, ослабление формирования завязи, резкое снижение качественных и количественных показателей урожая;
- ненормальное развитие корневой системы, образуется большое количество боковых корней коричневого цвета;
- двудольные растения теряют листья на верхушках стеблей.

Особенно чувствительны к дефициту железа:

- овёс,
- ячмень,
- пшеница,
- подсолнечник,
- овощные,
- плодовые культуры.

"Микровит К-1 хелат Cu" быстро и эффективно решит проблему недостатка железа у всех сельскохозяйственных культур.

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Сроки
Зерновые, зернобобовые	0,3 - 1,0	Зерновые: в фазе кущения и трубкования; зернобобовые: фаза 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начало ветвления, фаза бутонизации
Рапс, горчица, козец, редька масличная	0,3-1,0	Фаза 3-5 настоящих листьев, период формирования стебля
Кукуруза, сорго, просо	0,5 - 1,5	Фаза 3-5 листьев, фаза 6-9 листьев
Сахарная, кормовая, столовая свекла, морковь, брюква, турнепс	0,5 - 1,5	Фаза 3-4 настоящих листьев, период смыканя рядков, период смыкания междурядий
Подсолнечник	0,5 - 1,5	Фаза 3-5 листьев, фаза 6-9 листьев
Овощные культуры	0,5 - 2,0	2-3 некорневых подкормки с интервалом 2 недели
Плодовые, виноград	2 - 4	перед цветением, после цветения, в период роста плодов, после сбора урожая
Ягодные культуры, декоративные деревья/ кустарники	1 - 3	Ягодные - после цветения. Декоративные: 1-3 обработки за сезон, начиная с возобновления весенней вегетации
Газонные травы	0,3 - 1,0	2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней
Гидропоника, малообъёмные технологии, корневая подкормка	2,5 - 3,5 л/1000 л 3-6 л/га	Компонент для приготовления маточного раствора. Корневая подкормка.