Микровит-4 хелат Cu

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная культура	Нормы расхода:		Сроки применения
	препарат	рабочий р-р	
Озимые и яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, овес, рис)	0,3–0,8 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе кущения* Некорневая подкормка в фазе трубкования* Некорневая подкормка в фазе флагового листа* Некорневая подкормка в фазе колошения*
Зернобобовые культуры (горох, бобы, соя, нут, люпин, фасоль, чечевица)	0,3–0,6 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе 3–5 листьев, высоты всходов 10–12 см, начала ветвления*
Рапс, горчица, козец, редька масличная	0,5–1,5 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в период формирования стебля* Некорневая подкормка в фазе бутонизации*
Кукуруза, сорго, просо	0,4–1,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе 3–5 листьев* Некорневая подкормка в фазе 6–9 листьев*
Овощные культуры	0,3–1,0 л/га	200–500 л/га	2–3 некорневых подкормки с интервалом 2 недели
Картофель	0,5–1,0 л/га	200–400 л/га	Некорневая подкормка при высоте всходов 10–15 см* Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)* Некорневая подкормка в фазу роста клубней*
Плодовые культуры, виноград	0,5–3,0 л/га	500–1000 л/га	Некорневая подкормка при возобновлении весенней вегетации* Некорневая подкормка после цветения* Некорневая подкормка в период роста плодов*
Ягодные культуры	0,5–1,0 л/га	300–600 л/га	Некорневая подкормка при возобновлении вегетации* Некорневая подкормка после цветения*
Прочие сельско-хозяйственные культуры	0,1–1,5 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка по показаниям почвенной или листовой диагностики
Гидропоника, малообъемные технологии, корневая подкормка	Корректировка концентрации элемента питания в маточном растворе		Компонент для приготовления маточного раствора
			Корневая подкормка (внесение через системы полива)

* Возможно одновременно в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями после проверки на совместимость.