Элитные агросистемы

Внимание! Приобретайте препараты ООО "Элитные Агросистемы" только у официальных дистрибьюторов.

+7 (499) 322-01-24
info@microvit.ru
www.microvit.ru
Московская обл., г. Воскресенск,
ул. 2-я Заводская, зд. 18, оф. 23

Элитные агросистемы

Элитные агросистемы

АМИЦИД
БОР

Аминокислотный препарат с росторегуляторами и высокой концентрацией бора

Профессиональная серия

АМИЦИД
БОР -

препарат на основе аминокислот, содержащий высокую концентрацию бора в легкодоступной для растений форме и усиленный росторегуляторами. Применяется по вегетации посредством листовых подкормок.

Состав, г/л:

N	B	L-Аминокислоты	Гидроксикарбоновые кислоты
64	**150**	**20**	**40**

Плотность: 1,32 – 1,42 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 6,0 – 9,0

Основные преимущества:

- совместимость с большинством пестицидов и удобрений;
- удобная форам – жидкость, идеально растворимая в воде;
- высокая концентрация бора;
- повышенная доступность элемента бора для растений за счёт аминокислот и глюконовой кислоты;
- антистрессовый эффект;
- ростостимулирующие свойства;
- максимальная поддержка цветения и плодообразования.

Благодаря высокому содержанию бора:

- повышает устойчивость к высоким температурам и недостатку влаги за счёт предотвращения блокировки обменных процессов;
- повышает устойчивость к низким температурам за счет накопления сахаров и повышения концентрации клеточного сока;
- активизирует формирование корневой системы;
- усиливает синтез белков и углеводов;
- повышает фертильность пыльцы и завязываемость плодов;
- нормализует плодоношение и созревание;
- предотвращает развитие ряда заболеваний.

Аминокислоты препарата обеспечивают:

- устойчивость к стрессовым ситуациям;
- усиление фотосинтеза;
- устойчивость к засухе и суховеям;
- стимуляцию опыления и оплодотворения;
- активизацию и усиление цветения;
- накопление сахаров и пластических веществ.

Гидроксикарбоновые кислоты (янтарная и глюконовая) выступают как:

- росторегуляторы, активизирующие ростовые процессы и цветение;
- адаптогены, запускающие адаптацию растений к стрессовым факторам;
- компоненты, повышающие способность растений усваивать питательные вещества из почвы;
- компоненты, повышающие доступность бора для растений.

Способы и нормы применения

"Амицид Бор" предназначен для листовых обработок растений. При необходимости препарат также может выступать как корректор содержания бора в питательных растворах систем гидропоники

- Применение **в период закладки плодовых почек** способствует максимальной реализации генетического потенциала культуры.
- Применение **в момент бутонизации - начала цветения** способствует максимальной завязываемости плодов.
- Применение **в фазу роста и налива урожая** способствует максимальному накоплению сахаров и пластических веществ.
- Применение **перед похолоданием** (возвратными заморозками) повышает холодоустойчивость.
- Применение **в условиях недостатка влаги** повышает засухоусточивость растений.

Сроки применения, культура	Норма расхода, л/га
Некорневая обработка сахарной свеклы в момент роста корнеплода и накопления сахаров	0,4–1,5
Некорневая обработка подсолнечника в момент закладки корзинки и в начале цветения	0,4–1,3
Некорневая обработка рапса в момент развития корневой системы в момент бутонизации	0,4–1,3
Некорневая обработка зернобобовых культур в начале цветения и накопление белков в семенах	0,3–1,0
Некорневая обработка овощных культур	0,3–1,3
Некорневая обработка плодово-ягодных культур	0,5–2,0
Некорневая обработка прочих с/х культур при наличии дефицита бора	0,3–1,3
Некорневая обработка при температурных стрессах с целью повышения устойчивости растений к высоким или низким температурам	0,5–1,0

Кратность обработок – 1–4 обработки за сезон в зависимости от культуры, но не чаще, чем 1 раз в 10 дней.