Элитные агросистемы

Внимание! Приобретайте препараты ООО "Элитные Агросистемы" только у официальных дистрибьюторов.

+7 (499) 322-01-24
info@microvit.ru
www.microvit.ru
Московская обл., г. Воскресенск,
ул. 2-я Заводская, зд. 18, оф. 23

Элитные агросистемы

Элитные агросистемы

АМИЦИД
МИКРО

Комплексный препарат с аминокислотами, полипептидами и микроэлементами

Профессиональная серия

АМИЦИД
Микро

комплексный препарат, содержащий композицию аминокислот и полипептидов совместно с микроэлементами в хелатной форме.
Основное применение – предпосевная обработка семян и листовые обработки.

Состав, г/л:

N	S	Mn	Mg	Zn	Cu	B	Fe	Mo	Co
45	**134**	**24**	**23**	**22**	**20**	**9,4**	**4**	**2,1**	**1**

Композиция аминокислот и полипептидов – 175 г/л. Содержит 3 аминокислоты: глицин, лизин, глутаминовая кислота.

Плотность: 1,34 – 1,37 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 3,5 – 4,5

Благодаря аминокислотам, препарат:

- активизирует прорастание семян;
- способствует росту тканей растения;
- стимулирует синтез хлорофилла;
- повышает устойчивость к почвенной и воздушной засухе;
- улучшает процессы опыления и оплодотворения;
- повышает проникновение препаратов баковой смеси в ткани растения;
- проявляет антистрессовый эффект.

Благодаря микроэлементам, препарат:

- повышает энергию прорастания семян,
- повышает устойчивость растений к патогенным и климатическим стрессам;
- обеспечивает элементами питания растение и наиболее важные периоды роста;
- способствует развитию корневой и надземной массы;
- способствует накоплению белков и углеводов в растении и отдельных элементах урожая;
- способствует усвоению основных элементов питания из почвы и применяемых удобрений.

Совместное применение

Со средствами защиты растений:

Совместное применение с химическими СЗР препарата "Амицид Микро" позволяет:

- снизить токсическое действие СЗР на развитие растений;
- снизить негативное влияние СЗР на всхожесть семян;
- снизить угентение СЗР ризосферных микроорганизмов;
- повысить эффективность СЗР за счёт лучшего проникновения и повышения общей устойчивости растений

С биопрепаратами:

Препарат "Амицид Микро" совместим со многими биопрепаратами. Совместное применение препаратов способствует более активному развитию микроорганизмов биопрепарата. Наличие аминокислот делает "Амицид Микро" предпочтительней, по сравнению с препаратами, содержащими только микроэлементы. При этом для предотвращения угнетения биопрепаратов или эффекта "консервации" норма применения "Амицида Микро" занижается.

Рекомендации по применению

Наиболее актуально применение препарата **"Амицид Микро"**: при обработке семян, в ранневесенний период; в периоды активного роста вегетативной массы; в стрессовых условиях.

Культура	Норма расхода, л/га	Фаза
Зерновые, зернобобовые	0,3 – 1,0	Фаза кущения, выхода в трубку, флагового листа, колошения
Рапс, горчица	0,2 – 0,6	Фаза 3-5 листьев, формирование стебля, бутонизации
Кукуруза, сорго, просо	0,3 – 1,0	Фаза 3-5 листьев, 6-9 листьев
Сахарная, кормовая, столовая свекла, морковь	0,3–1,0 л/га	Фаза 3-4 листьев, период смыкания рядков, смыкание междурядий, за 20 дней до уборки
Подсолнечник	0,3 – 1,0	фаза 3-5 листьев, 6-9 листьев
Овощные культуры	0,3–1,5	фаза 3-4 листьев, после высадки рассады, период бутонизации
Бахчевые культуры	0,3–1,0	фаза шатрика, 3-5 листьев, рост плетей, бутонизация, рост плодов
Плодовые культуры, виноград	1,0–2,5	возобновление весенней вегетации, перед и после цветения, рост плодов, начало созренвания, сбор урожая
Декоративные деревья и кустарники	1,0–2,0	3-4 обработки за сезон, начиная с возобновления весенней вегетации
Газонные травы	0,2–0,8	Некорневые подкормки 2-5 раз за вегетацию м интервалом 20 дней