Элитные агросистемы

Внимание! Приобретайте препараты ООО "Элитные Агросистемы" только у официальных дистрибьюторов.

+7 (499) 322-01-24
info@microvit.ru
www.microvit.ru
Московская обл., г. Воскресенск,
ул. 2-я Заводская, зд. 18, оф. 23

Элитные агросистемы

Элитные агросистемы

МИКРОВИТ К-1
хелат Fe

Высокоэффективный препарат для борьбы с хлорозом (дефицитом железа)

Профессиональная серия

МИКРОВИТ К-1
хелат Fe

Высокоэффективный препарат для борьбы с хлорозом (дефицитом железа). Основное применение – малообъёмные технологии, фертигация и внекорневые подкормки.

Состав, г/л:

N	S	Fe
6	**49**	**30**

Комплексон: DTPA
Плотность: 1,1 – 1,2 г/см3 при +18°С
pH 1% раствора: 3,5-4,5

Железо является функциональной частью ферментативных систем, участвующих в окислительно-восстановительном и энергетическом обменах в растении, в образовании хлорофилла.

В большинстве почв железо присутствует в трудно растворимых и, соответственно, плохо усваиваемых растениями формах.
Подвижность железа уменьшается при кислотности более 6.
Усугубляет дефицит железа внесение в почву фосфорных удобрений.

Проявление недостатка железа:

- светло-жёлтые, почти белёсые листья на молодых побегах, при этом старые листья долго остаются зелёными;
- соцветия развиваются слабыми, мелкими;
- задерживается синтез ростовых веществ – ауксинов.

Особенно чувствительны к дефициту железа:

- огурец,
- морковь,
- томат,
- картофель,
- капуста,
- кукуруза,
- плодовые культуры (слива, груша, персик, яблоня, малина, виноград, цитрусовые);
- розы.

"Микровит К-1 хелат Fe", созданный на основе комплексонатов, применяется с лечебной целью, а также для профилактики хлороза на различных культурах. Можно вносить в почву при корневой подкормке и через системы капельного полива.

Также применяется для листовой подкормки, что особенно актуально для плодовых, овощных и ягодных культур.

Рекомендации по применению

Культура	Норма расхода, л/га	Сроки
Зерновые, зернобобовые	0,3 – 1,0	Зерновые: в фазе кущения и трубкования; зернобобовые: фаза 3-5 листьев, высоты всходов 10-12 см, начало ветвления, фаза бутонизации
Рапс, горчица, козец, редька масличная	0,3-1,0	Фаза 3-5 настоящих листьев, период формирования стебля
Кукуруза, сорго, просо	0,5 – 1,5	Фаза 3-5 листьев, фаза 6-9 листьев
Сахарная, кормовая, столовая свекла, морковь, брюква, турнепс	0,5 – 1,5	Фаза 3-4 настоящих листьев, период смыканя рядков, период смыкания междурядий
Подсолнечник	0,5 – 1,5	Фаза 3-5 листьев, фаза 6-9 листьев
Овощные культуры	0,5 – 2,0	2-3 некорневых подкормки с интервалом 2 недели
Плодовые, виноград	2 – 4	перед цветением, после цветения, в период роста плодов, после сбора урожая
Ягодные культуры, декоративные деревья/ кустарники	1 – 3	Ягодные – после цветения. Декоративные: 1-3 обработки за сезон, начиная с возобновления весенней вегетации
Газонные травы	0,3 – 1,0	2-5 раз за вегетацию с интервалом 20 дней
Гидропоника, малообъёмные технологии, корневая подкормка	2,5 – 3,5 л/1000 л 3-6 л/га	Компонент для приготовления маточного раствора. Корневая подкормка.