Амицид Зерновой

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная культура	Нормы расхода:		Сроки применения
	препарат	рабочий р-р	
Зерновые, зернобобовые, технические, масличные, кормовые культуры	0,5–1,5 л/т	10 л/т	Предпосевная обработка семян
Озимые и яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, овес, рис)	0,2–2,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе кущения* Некорневая подкормка в фазе трубкования* Некорневая подкормка в фазе флагового листа*
Зернобобовые культуры (горох, бобы, соя, нут, люпин, фасоль, чечевица)	0,2–2,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе 3–5 листьев, высоты всходов 10–12 см, начала ветвления* Некорневая подкормка в фазе бутонизации*
Рапс, горчица, козец, редька масличная	0,2–2,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазу 3–5 настоящих листьев* Некорневая подкормка в период формирования стебля* Некорневая подкормка в фазе бутонизации*
Кукуруза, сорго, просо	0,2–2,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе3–5 листьев* Некорневая подкормка в фазе 6–9 листьев*
Сахарная, кормовая, столовая свекла, морковь, брюква, турнепс	0,2–2,0 л/га	200–400 л/га	Некорневая подкормка в фазе 3–4 настоящих листьев* Некорневая подкормка в период смыкания рядков* Некорневая подкормка в период смыкания междурядий*
Подсолнечник	0,2–2,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазе3–5 листьев* Некорневая подкормка в фазе 6–9 листьев*
Овощные культуры	0,2–2,0 л/га	200–500 л/га	2–3 некорневых подкормки с интервалом не чаще 1 раз в 10 дней*
Картофель	0,5–3,0 л/га	200–400 л/га	Некорневая подкормка при высоте всходов 10–15 см* Некорневая подкормка в фазу бутонизации (закладки клубней)* Некорневая подкормка в фазу роста клубней*
Бахчевые культуры	0,2–2,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в фазу шатрика, 3–5 листьев* Некорневая подкормка в фазу роста плетей* Некорневая подкормка в фазу бутонизации*
Кормовые травы	0,2–1,5 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка при возобновлении весенней вегетации, высоты всходов 5–10 см* Некорневая подкормка после укоса при отрастании отавы 5 см* Некорневая подкормка в момент бутонизации (на семеноводческих посевах)*
Плодовые культуры, виноград	1,0–5,0 л/га	500–1000 л/га	Некорневая подкормка перед цветением* Некорневая подкормка после цветения* Некорневая подкормка в период роста плодов*
Ягодные культуры	0,3–3,0 л/га	300–600 л/га	Некорневая подкормка при возобновлении вегетации* Некорневая подкормка перед цветением*
Цветочно–декоративные культуры	0,2–2,0 л/га	200–400 л/га	Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не чаще раз в 2 недели*
Прочие сельско-хозяйственные культуры	0,1–2,0 л/га	200–300 л/га	Некорневая подкормка в период активного роста вегетативных органов – бутонизация

Действие препарата в зависимости от дозировок при расходе рабочего раствора 200–300 л/га:
0,2–0,4 л/га – антистрессовый эффект, повышение проникающей способности СЗР
0,5–1,2 л/га – стимуляция ростовых процессов, цветения и образования завязи. Усиление синтеза белков и сахаров.
1,2–2,0 л/га – запуск регенерационных процессов на растениях поврежденных вредителями, болезнями, СЗР, засухой, градом, заморозками.