Амицид Овощной

Рекомендации по применению

Сельскохозяйственная культура	Нормы расхода:		Сроки применения
	препарат	рабочий р-р	
Томат, баклажан, перец, огурец	0,2-1,5 л/га	200-500 л/га	2-3 некорневых подкормки с интервалом не чаще 1 раз в 10 дней*
Рапс, горчица, козец, редька масличная	0,2-1,5 л/га	200-300 л/га	Некорневая подкормка в фазу 3-5 настоящих листьев*
			Некорневая подкормка в период формирования стебля*
			Некорневая подкормка в фазе бутонизации*
Бахчевые культуры	0,2-2,0 л/га	200-300 л/га	Некорневая подкормка в фазу шатрика, 3-5 листьев*
			Некорневая подкормка в фазу роста плетей*
			Некорневая подкормка в фазу бутонизации*
Ягодные культуры	0,3-2,0 л/га	300-600 л/га	Некорневая подкормка при возобновлении вегетации*
			Некорневая подкормка перед цветением*
Цветочно-декоративные культуры	0,2-1,5л/га	200-400 л/га	Некорневые подкормки во время вегетации по потребности с интервалом не чаще раз в 2 недели*
Прочие сельскохозяйственные культуры	0,1-1,5 л/га	200-300 л/га	Некорневая подкормка в период активного роста вегетативных органов - бутонизация
Фертигация (грунтовые овощи)	3-5 л/га	Не менее 1000 л/га	Внесение с поливными водами в период вегетации с интервалом не менее 10 дней
Гидропоника, малообъёмные технологии	3-5 л/1000 л рабочего раствора	150-300 мл 0,3-0,5% раствора на 1 растение	Внесение препарата с питательным раствором в период вегетации