



# Рапсон

## Рекомендации по применению

При самостоятельном применении препарата «Рапсон», необходимо обеспечить полное смачивание обрабатываемых растений, что достигается расходом рабочей жидкости не менее 300 л/га. Период защитного действия препарата до 10 дней.

При совместном применении с СЗР, объем расхода рабочего раствора устанавливается на основе рекомендаций применяемых СЗР.

Кратность обработок 1 раз в 10–14 дней. При инсектицидных обработках при сильно-развитых популяциях допускается проведение трех обработок с интервалом в 5 дней.

Профилактические обработки от мучнистой росы	0,5% (0,5 л/100 л раствора)
Лечебные обработки от мучнистой росы	0,8–1,0% (0,8–1,0 л/100 л раствора)
Обработки от мучнистой росы в составе баковой смеси с СЗР*	0,5–0,8% (0,5–0,8 л /100 л раствора)
Обработки против тли, клеща, трипса, белокрылки	0,5–1,0% (0,5–1,0 л/100 л раствора)
Обработки против тли, клеща, трипса, белокрылки в составе баковой смеси с СЗР*	0,4–0,6% (0,4–0,6 л/100 л раствора)
В качестве прилипателя, совместно с СЗР*	0,1–0,4% (0,1–0,4 л/100 л раствора)

\* Возможность одновременного применения в смеси со средствами защиты растений и водорастворимыми удобрениями устанавливается после проверки на совместимость.